



CÓMO PUEDES ACCEDER A LA VACUNACIÓN DE TU HIJO/HIJA

- ❖ El Servicio de Salud del Principado de Asturias te enviará un mensaje a tu teléfono móvil como madre/padre/tutor legal de los niños/as con indicación de vacunación por edad.
- ❖ Pide cita con tu enfermera de Pediatría de Atención Primaria en cuanto comience la campaña de vacunación 2025/2026. Es importante que la inmunización se realice antes de que el virus de la gripe comience a circular.
- ❖ Consulta la ampliación de horarios para vacunación en los Centros de Salud. Esta medida tiene como objetivo favorecer a la población el acceso a las vacunas.

**La campaña comienza el martes 14 de octubre
¡Estate atento/a!**

**La salud de tus hijos/as,
nuestra prioridad.**

Estamos para ayudarte,
estamos para cuidarte.
Para más información,
consulta a tu profesional
sanitario de referencia.



Elaborado por el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública Área Sanitaria VII
Fecha de elaboración: 30/09/2025

Revisado por: Marta Huerta Huerta y Rubén Castaño Pacho. Responsables del Programa de Vacunas del Principado de Asturias,
y Francisco Álvarez García. Centro de Salud Llanera Área Sanitaria IV.

VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE EN NIÑOS DE 6 MESES A 59 MESES



**¿GRIPE?
No, gracias**

(Abre este folleto y sigue leyendo. Hemos intentado hacerlo sencillo y ameno)

VACUNACIÓN FRENTE A GRIPE EN NIÑOS DE 6 MESES A 59 MESES:

Infórmate y protégele



QUÉ ES Y CÓMO SE CONTAGIA

- ❖ Es un virus que causa infecciones respiratorias, desde un simple resfriado hasta una neumonía vírica o bacteriana, en este último caso por sobreinfección.
- ❖ Se propaga fácilmente al toser, estornudar o al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara.
- ❖ Es muy contagioso, ¡especialmente en niños/as en el entorno doméstico y preescolar/escolar!



SÍNTOMAS MÁS COMUNES EN EL NIÑO/A

- ❖ Fiebre elevada, secreción nasal, tos, ronquera, dolor de garganta, fatiga, ruidos de pitos al respirar (sibilancias) y vómitos. El dolor de cabeza es característico en niños mayores.
- ❖ En ocasiones los/as niños/as menores de 5 años sanos (sin factores de riesgo) presentan cuadros graves que dan lugar a insuficiencia respiratoria o complicaciones relacionadas con la fiebre como convulsiones febriles, o el síndrome febril sin foco que, en los lactantes pequeños, hacen necesario el ingreso hospitalario.
- ❖ Las complicaciones por el virus de la gripe en niños/as son tan frecuentes como las complicaciones por este virus en los mayores de 70 años.




EN QUÉ EDADES DEBEN VACUNARSE LOS/AS NIÑOS/AS Y CON QUÉ TIPO DE VACUNA

- ❖ **Los niños de 6 meses a 59 meses deben recibir la vacuna frente a gripe estacional en Asturias al igual que en el resto de España en la campaña 2025/2026.** Esta vacunación forma parte de su calendario de inmunización en la etapa infantil.
- ❖ Tipos de vacunas disponibles:
 - ❖ **Entre los 6 meses y los 23 meses de edad:** vacuna trivalente inactivada de cultivo celular intramuscular (Flucelvax)
 - ❖ **Entre los 24 meses y los 59 meses de edad:** vacuna trivalente atenuada intranasal (Fluenz)



CUÁNDO Y CÓMO LES AFECTA

- ❖ **Circulación estacional:** este virus tiene su "temporada" alta cada año, generalmente desde octubre hasta marzo, pero sobre todo en diciembre y enero, justo después de que circule el virus respiratorio sincitial.
- ❖ **Carga de enfermedad:** cada año el virus de la gripe causa ingresos hospitalarios en niños, especialmente entre los 6 meses y los 59 meses. Igualmente sabemos que más del 50% de los niños que hospitalizan las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos son niños sanos (sin factores de riesgo). Cada año fallecen entre 8 y 10 niños en España por complicaciones del virus de la gripe.



CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS DISPONIBLES PARA LOS/AS NIÑOS/AS EN ASTURIAS

	Flucelvax	Fluenz
Tipo de vacuna	Inactivada	Atenuada
Edad de administración	6 meses – 23 meses	24 meses – 59 meses
Vía de administración	Intramuscular (en el muslo)	Intranasal (pulverización a través de las fosas nasales)
Eficacia en niños (protección) <small>Información extraída de las Fichas Técnicas</small>	50,67% en niños/as de 6 meses a 4 años de edad	54,9% en niños/as de 6 meses a 59 meses
Reacciones adversas	Enrojecimiento, aumento de la temperatura local, molestia en la zona de inyección, febrícula/ fiebre y que cede con paracetamol	Estornudos, picor nasal, febrícula/ fiebre transitoria y que cede con paracetamol
Contraindicaciones	Alergia grave a algún componente de la vacuna o a la vacuna si la ha recibido previamente	Alergia grave a algún componente de la vacuna o a la vacuna si la ha recibido previamente. Niños inmunodeprimidos, convivientes de grandes inmunodeprimidos o en tratamiento crónico con salicilatos